

「派地巴汀」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 27 日農授防字第 1131876003A 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱 | 英文普通名稱 | IUPAC/有效成分 |
|------|-------------------------|---|
| 派地巴汀 | spiropidion + abamectin | (1) 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate (IUPAC) (2) >80% avermectin B1a: 5-O-demethyl avermectin A1a <20% avermectin B1b: 5-O-demethyl-25-de-(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a |

二、「派地巴汀」農藥使用方法與範圍一覽表

115 g/L (11.5% w/v) 派地巴汀 水懸劑(SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|---------|-------|------------|---------|-------|------|----------|-----------|-----------------------|
| 柑桔類 | 柑桔銹蟎 | 0.67 公升 | 3,000 | 害蟎發生時開始施藥。 | 21 | 共 2 次 | | 28 | 避免於開花期施藥。 | 原始登記廠商名稱：台灣先正達股份有限公司。 |