

火鶴花穿孔線蟲緊急防治藥劑與使用方法及其範圍

藥劑名稱	每公頃 每次施藥 量	稀釋倍數	施藥時期及方法	注意事項
400 g/L (40% w/v) 氟派瑞水懸劑 (SC)	3公升	1,000	每株澆灌50毫升，或每公頃澆灌3,000公升藥液。根圍栽培介質或土壤澆灌2次，中間間隔1個月。	適用於盆植形式種植之火鶴花。施用前請保持介質或土壤濕潤，並小範圍施用確認無藥害產生。
500 g/L (50% w/v) 氟派瑞水懸劑 (SC)	2.4公升	1,250	每株澆灌50毫升，或每公頃澆灌3,000公升藥液。根圍栽培介質或土壤澆灌2次，中間間隔1個月。	適用於盆植形式種植之火鶴花。施用前請保持介質或土壤濕潤，並小範圍施用確認無藥害產生。
480 g/L (48% w/v) 氟速芬乳劑 (EC)	1.5公升	2,000	每株澆灌50毫升，或每公頃澆灌3,000公升藥液。根圍栽培介質或土壤澆灌2次，中間間隔1個月。	適用於盆植形式種植之火鶴花。施用前請保持介質或土壤濕潤，並小範圍施用確認無藥害產生。
10(%) (w/w) 毆殺滅 溶液 (SL)	10公升	300	每株澆50毫升，或每公頃澆灌3,000公升藥液。根圍栽培介質或土壤澆灌2次，中間間隔1個月。	適用於盆植形式種植之火鶴花。施用前請保持介質或土壤濕潤，並小範圍施用確認無藥害產生。
40(%) (w/w) 芬滅松 乳劑 (EC)	1.5公升	2,000	每株澆灌50毫升，或每公頃澆灌3,000公升藥液。根圍栽培介質或土壤澆灌2次，中間間隔1個月。	適用於盆植形式種植之火鶴花。施用前請保持介質或土壤濕潤，並小範圍施用確認無藥害產生。