

農業部公告

中華民國113年8月8日

農授防字第1131876445A號

主 旨：公告修正「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依 據：農藥管理法第十三條。

「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 8 月 8 日農授防字第 1131876445A 號公告修正
500 g/L (50% w/v) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
落花生	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
紅豆	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
甘藷	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
豆薯	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
山藥	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蘿蔔	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蕪菁	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				將稀釋液噴佈於土表。						
牛蒡	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蒜	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。					適用於蒜頭。	
薑	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
芋	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
番茄	根瘤線蟲	0.2 公升	4,000	於植株定植後第 3 天澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線	0.1-0.3	4,000	於植株定植後					施用前請保	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲	公升		澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					持土壤濕 潤。	
茄子	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
枸杞	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
香瓜茄	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公 升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
樹番茄	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆					施用前請保 持土壤濕 潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				灌 250-1,000 公升藥液。						
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.3公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.3公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
香蕉	根瘤線蟲	0.45 公升	10,000	限苗期使用，使用前須維持根圈土壤濕						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線 蟲	0.46- 0.72 公 升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用 前保持土壤濕 潤。						
柑桔類	柑桔線 蟲	0.5 公 升	2,000	作物春芽萌發 時使用，先以適 量水量潤濕土 壤，再沿樹冠滴 水線澆灌 2 公升 藥液 1 次。					依使用方法 用藥，無需 訂定安全採 收期。	本項新 增。原 始登記 廠商名 稱：台 灣拜耳 股份有 限公 司。

400 g/L (40% w/v) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
落花生	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
紅豆	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
甘藷	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
豆薯	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
山藥	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蘿蔔	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
燕菁	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
牛蒡	根瘤線	0.5 公	3,000	播種後子葉展						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲	升		開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
馬鈴薯	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蒜	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。					適用於蒜頭。	
洋蔥	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
胡蘿蔔	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
薑	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
芋	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
番茄	根瘤線蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植後第 3 天澆灌稀釋藥液 1 次，					施用前保持土壤濕潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。						
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線	0.1-0.4	3,000	於植株定植後					施用前請保	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蟲	公升		澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				灌 50-1,000 公 升藥液。					嫩葉接 觸到較 高劑量 氟派瑞 時，會 引起葉 緣發生 黃白化 藥斑之 現象。	
香蕉	根瘤線 蟲	0.6 公 升	7,500	限苗期使用， 使用前須維持 根圈土壤濕 潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線 蟲	0.62- 0.96 公 升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用 前保持土壤濕 潤。						
柑桔類	柑桔線 蟲	0.6 公 升	1,600	作物春芽萌發 時使用，先以適 量水量潤濕土 壤，再沿樹冠滴 水線澆灌 2 公升 藥液 1 次。					依使用方法 用藥，無需 訂定安全採 收期。	本項新 增。原 始登記 廠商名 稱：台 灣拜耳 股份有 限公 司。